


ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΑΙΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ


μολυσμένα ζώα



ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ

κατάπωση μολυσμένων χόρτων

ευαίσθητα ζώα



Μολυσμένα προϊόντα


ΜΕΛΙΤΑΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΜΕΛΙΤΑΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ


επαφή με μολυσμένα ζώα (συνήθως μέσω αμυχών του δέρματος)

Προϊόντα αποβολών αιγών και προβάτων (έμβρυα, εμβρ. υμένες, εμβρ. υγρά)

κατανάλωση φρέσκων τυριών, άβραστου γάλακτος, ωμού ή μισοψημένου κρέατος μολυσμένων ζώων.



αγρότες/εργάτες σφαγείων/κρεοπώλες
16/5/2005
(ποσοστό μόλυνσης 90 %)



γενικός πληθυσμός (ποσοστό μόλυνσης 40 %)

Edited by N. Charisis

ΣΤΑ ΚΟΠΑΔΙΑ

Το Υπουργείο Γεωργίας έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα για την καταπολέμηση ης Βρουκέλλωσης στα κοπάδια, το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία σε ολόκληρη τη χώρα. Στις περιοχές όπου το ποσοστό μόλυνσης είναι μικρότερο του 5% έχει υιοθετηθεί η πολιτική της ορολογικής διάγνωσης, της σφαγής των μολυσμένων ζώων και της αποζημίωσης των ιδιοκτητών. Στις περιοχές με υψηλότερο ποσοστό μόλυνσης εφαρμόζονται εμβολιασμοί στα νεαρά ζώα, για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να επιτευχθεί το ποσοστό 5%. Όμως για την απόλυτη επιτυχία του προγράμματος απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των **κτηνοτρόφων**.

- **ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ**

- Τα υλικά των αποβολών, πλακούντες και έμβρυα πρέπει να συγκεντρώνονται σε στεγανά δοχεία και να καταστρέφονται κατά προτίμηση με καύση.

- Οι στάβλοι και τα μολυσμένα εργαλεία καθαρίζονται σχολαστικά και απολυμαίνονται με ισχυρά απολυμαντικά (φαινολικά, υποχλωριούχα, ιωδοφόρειο, καυστική σόδα κλπ).

- Η κοπριά να συλλέγεται καθημερινά και να συγκεντρώνεται σε σωρούς όπου θα παραμένει τουλάχιστον για ένα χρόνο, διαφορετικά πρέπει να καίγεται ή να απολυμαίνεται πριν χρησιμοποιηθεί.




- Τα οχήματα που μπαίνουν ή βγαίνουν απ' τη μολυσμένη εκτροφή, πρέπει να περνούν μέσα από λάκκους με απολυμαντικό, γιά να απολυμαίνονται οι ρόδες τους.

- Δεν πρέπει να εισάγονται ζώα στις μολυσμένες εγκαταστάσεις, πριν περάσει ένας μήνας από την


- απολύμανση. Τα νέα ζώα πρέπει να είναι από περιοχές απαλλαγμένες από **Μελιταίο Πυρετό** ή να έχουν υποστεί τις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές πριν την εγκατάστασή τους στη μονάδα.

- Να αποφεύγεται η επαφή των υγιών ζώων με άλλα κοπάδια (π.χ. κοινές βοσκές).

- Η καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών στις εκτροφές πρέπει να είναι συνεχής και κάτω από την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών.




ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΛΙΤΑΙΟ ΠΥΡΕΤΟ




• ΓΑΛΑ/ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Να αποφεύγεις το άβραστο ή απαστερίωτο γάλα ή τα προϊόντα που προέρχονται απ' αυτό. Βρασμός του γάλακτος για λίγα λεπτά αρκεί για να το καταστήσει ασφαλές. Γενικά τα σκληρά τυριά, το βούτυρο, το ξινόγλο και το γιαούρτι παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό κινδύνου από τα μαλακά φρέσκα τυριά. Τα φρέσκα τυριά τύπου "φέτας" δεν πρέπει να καταναλώνονται νωρίτερα των δύο μηνών από την παρασκευή τους.



• ΚΡΕΑΣ/ΙΣΤΟΙ/ΟΡΓΑΝΑ

- Να αποφεύγεις την κατανάλωση ανεπαρκώς μαγειρεμένων κρεάτων και ιδίως σπλήνα, νεφρών, συκωτιών, μαστών και όρχεων. Κίνδυνος υπάρχει επίσης από το χειρισμό ωμών μολυσμένων κρεάτων ή οργάνων, επειδή υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης άλλων τροφίμων από βρώμικα χέρια ή μαγειρικά σκεύη και εργαλεία.



• ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

- Όταν έρχεσαι σε επαφή με ζώα μολυσμένα πρέπει να φοράς προστατευτικά ρούχα, πλαστικά γάντια και κατάλληλα γυαλιά που να προστατεύουν τα μάτια σου. Ρούχα και συσκευές πρέπει να αποστειρώνονται μετά τη χρήση με βρασμό και τα παπούτσια με εμβάπτιση σε απολυμαντικά για να μη μεταφέρεται η μόλυνση έξω από τις εγκαταστάσεις.

- Όσοι ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα ζώα χωρίς να φορούν γάντια, να πλένονται καλά με σαπούνι και να χρησιμοποιούν βάμμα ιωδίου σε τυχόν ανοιχτά τραύματα και εκδορές.

- Σε περιπτώσεις επαφής του βλεννογόνου των ματιών με μολυσμένα υλικά πρέπει αμέσως να ξεπλένονται με άφθονο καθαρό νερό μακριά από την περιοχή εργασίας και ακολούθως να εσταλλάζεται κολλύριο με τετρακυκλίνη ή χλωραμφενικόλη. Άτομα που τρυπήθηκαν με σύριγγες που περιείχαν εμβόλιο πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία.

- Σε ιδιαίτερα μολυσμένο περιβάλλον συνιστάται η χρήση μάσκας για την αποφυγή εισπνοής μολυσμένης σκόνης.

