

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

- Τ Ρ Η Μ Α Τ Ω Δ Η -

ΔΙΣΤΟΜΩΣΗ ΗΠΙΑΤΙΚΗ

Α. ΦΑΣΙΟΛΙΩΣΗ (ή φασιόλωση)

Οφείλεται στο παράσιτο *Fasciola hepatica* και παρασιτεί ανθρώπους και φυτοφάγα ζώα που μολύνονται όταν καταπίνουν το παράσιτο με την τροφή τους (ο άνθρωπος μολύνεται μόνο από άβραστα χόρτα (κυρίως νεροκάρδαμο που καταλώνεται ωμό) και όχι από το κρέας). Εάν καταποθούν πάρα πολλά παράσιτα (2.000-5.000), τότε αναπτύσσεται οξεία μορφή και η είσοδος τους στο συκώτι προκαλεί θάνατο από εσωτερική αιμορραγία. Αν καταποθούν λίγα (200-500), τότε αναπτύσσεται η χρόνια μορφή όπου παρατηρείται απίσχνανση του ζώου και υπογνάθιο οίδημα.. Στους χοίρους δεν παρατηρούνται συμπτώματα.

Αλλοιώσεις: Στην οξεία μορφή το συκώτι είναι διογκωμένο, συμφωρημένο και σε τομή φαίνονται οι στοές που κάνει το παράσιτο γεμάτες αίμα και ανώριμα παράσιτα. Στη χρόνια μορφή είναι ωχρό και συμπαγές με ανώμαλο σχήμα.

Πρόληψη: Εάν οι αλλοιώσεις περιορίζονται στα χοληφόρα αγγεία αφαιρούνται και τα συκώτια δίνονται στην κατανάλωση. Αν οι αλλοιώσεις είναι εκτεταμένες απορρίπτονται.

Β. ΔΙΚΡΟΚΟΙΛΙΩΣΗ

Το παράσιτο *Dicrocoelium dendriticum* παρασιτεί και αυτό το συκώτι ανθρώπων και ζώων που μολύνονται όταν καταπίνουν χόρτα και λαχανικά που πάνω τους βρίσκονται μολυσμένα μυρμήγκια. Τα ζώα συνήθως δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα εκτός από πολύ βαριές περιπτώσεις όπου παρατηρείται αναιμία, υπογνάθιο οίδημα, απίσχνανση και κύρωση του ήπατος.

Προφύλαξη: Καλό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών. Τα αλλοιωμένα συκώτια απορρίπτονται.